



このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量			
		NRC		AAFCO	
/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	
イソロイシン	0.7%	258	224	150	147
ロイシン	1.1%	449	411	269	234
リジン	1.0%	401	205	139	249
メチオニン	0.3%	134	205	131	
シスチン	0.2%	77			
メチオニン・シスチン計	0.5%	209	392	257	170
フェニルアラニン	0.6%	254	280	178	
チロシン	0.5%	214			
フェニルアラニン・チロシン計	1.2%	467	448	293	289
スレオニン	0.6%	225	261	170	190
トリプトファン	0.2%	73	86	55	63
バリン	0.8%	304	299	194	154
ヒスチジン	0.5%	194	116	75	71
アルギニン	0.8%	331	205	139	202

このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量 (mg)	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	258	290	250	180	116	161
ロイシン	449	503	440	410	114	123
リジン	401	450	340	360	132	125
メチオニン・シスチン計	209	235	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	467	524	380	390	138	134
スレオニン	225	252	250	210	101	120
トリプトファン	73	82	60	70	137	117
バリン	304	341	310	220	110	155
ヒスチジン	194	218	-	120	-	181
全窒素量(g)	0.9					

