

このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量			
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	257	224	165	161
ロイシン	1.0%	443	411	295	256
リジン	0.9%	407	205	152	274
メチオニン	0.3%	130	205	143	
シスチン	0.2%	75			
メチオニン・シスチン計	0.5%	204	392	282	187
フェニルアラニン	0.6%	251	280	195	
チロシン	0.5%	209			
フェニルアラニン・チロシン計	1.1%	460	448	321	317
スレオニン	0.5%	226	261	187	208
トリプトファン	0.2%	71	86	61	69
バリン	0.7%	300	299	213	169
ヒスチジン	0.5%	197	116	82	78
アルギニン	0.7%	312	205	152	221

このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量 (mg)	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	257	291	250	180	116	162
ロイシン	443	502	440	410	114	122
リジン	407	461	340	360	136	128
メチオニン・シスチン計	204	231	220	160	105	144
フェニルアラニン・チロシン計	460	521	380	390	137	134
スレオニン	226	256	250	210	103	122
トリプトファン	71	80	60	70	134	115
バリン	300	340	310	220	110	155
ヒスチジン	197	223	-	120	-	186
全窒素量(g)	0.9					

