

サプリメント

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	190	224	156	152
ロイシン	0.8%	330	411	279	242
リジン	0.8%	316	205	144	258
メチオニン	0.2%	97	205	135	
シスチン	0.1%	41			
メチオニン・シスチン計	0.3%	137	392	267	176
フェニルアラニン	0.4%	176	280	185	
チロシン	0.4%	155			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	331	448	304	300
スレオニン	0.4%	163	261	176	197
トリプトファン	0.1%	47	86	57	66
バリン	0.5%	224	299	201	160
ヒスチジン	0.4%	147	116	78	74
アルギニン	0.5%	189	205	144	209

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	190	319	250	180	127	177
ロイシン	330	553	440	410	126	135
リジン	316	529	340	360	156	147
メチオニン・シスチン計	137	230	220	160	104	144
フェニルアラニン・チロシン計	331	554	380	390	146	142
スレオニン	163	273	250	210	109	130
トリプトファン	47	79	60	70	132	113
バリン	224	375	310	220	121	171
ヒスチジン	147	245	-	120	-	205
全窒素量(g)	0.6					

