

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	237	224	161	156
ロイシン	1.0%	410	411	288	249
リジン	0.9%	383	205	148	266
メチオニン	0.3%	120	205	140	
シスチン	0.2%	64			
メチオニン・シスチン計	0.4%	183	392	275	182
フェニルアラニン	0.5%	229	280	190	
チロシン	0.5%	195			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	424	448	313	309
スレオニン	0.5%	206	261	182	203
トリプトファン	0.2%	64	86	59	68
バリン	0.7%	276	299	207	165
ヒスチジン	0.4%	184	116	80	76
アルギニン	0.7%	277	205	148	216

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	237	302	250	180	121	168
ロイシン	410	522	440	410	119	127
リジン	383	487	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	183	233	220	160	106	146
フェニルアラニン・チロシン計	424	539	380	390	142	138
スレオニン	206	263	250	210	105	125
トリプトファン	64	81	60	70	136	116
バリン	276	351	310	220	113	159
ヒスチジン	184	235	-	120	-	195
全窒素量(g)	0.8					

