

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	225	224	144	141
ロイシン	1.0%	387	411	258	224
リジン	1.0%	382	205	133	239
メチオニン	0.3%	117	205	125	
シスチン	0.1%	53			
メチオニン・シスチン計	0.4%	169	392	247	163
フェニルアラニン	0.5%	204	280	171	
チロシン	0.5%	174			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	378	448	281	277
スレオニン	0.5%	202	261	163	182
トリプトファン	0.1%	57	86	53	61
バリン	0.7%	262	299	186	148
ヒスチジン	0.5%	186	116	72	68
アルギニン	0.6%	239	205	133	194

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	225	309	250	180	123	171
ロイシン	387	530	440	410	121	129
リジン	382	523	340	360	154	145
メチオニン・シスチン計	169	231	220	160	105	145
フェニルアラニン・チロシン計	378	517	380	390	136	133
スレオニン	202	277	250	210	111	132
トリプトファン	57	78	60	70	130	111
バリン	262	358	310	220	116	163
ヒスチジン	186	255	-	120	-	213
全窒素量(g)	0.7					

