

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	202	224	154	150
ロイシン	0.9%	349	411	276	240
リジン	0.8%	327	205	142	256
メチオニン	0.3%	124	205	134	
シスチン	0.2%	67			
メチオニン・シスチン計	0.5%	191	392	264	175
フェニルアラニン	0.5%	202	280	183	
チロシン	0.4%	166			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	368	448	301	297
スレオニン	0.4%	181	261	175	195
トリプトファン	0.2%	62	86	57	65
バリン	0.6%	247	299	199	158
ヒスチジン	0.6%	255	116	77	73
アルギニン	0.7%	277	205	142	207

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	202	268	250	180	107	149
ロイシン	349	464	440	410	105	113
リジン	327	435	340	360	128	121
メチオニン・シスチン計	191	254	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	368	489	380	390	129	126
スレオニン	181	241	250	210	96	115
トリプトファン	62	83	60	70	138	118
バリン	247	329	310	220	106	149
ヒスチジン	255	339	-	120	-	282
全窒素量(g)	0.8					

