

サプリメント

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	215	224	166	161
ロイシン	0.9%	371	411	296	257
リジン	0.8%	358	205	152	274
メチオニン	0.2%	106	205	144	
シスチン	0.1%	52			
メチオニン・シスチン計	0.4%	157	392	283	187
フェニルアラニン	0.5%	203	280	196	
チロシン	0.4%	171			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	374	448	322	318
スレオニン	0.4%	188	261	187	209
トリプトファン	0.1%	55	86	61	70
バリン	0.6%	250	299	213	170
ヒスチジン	0.4%	175	116	83	78
アルギニン	0.5%	224	205	152	222

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	215	310	250	180	124	172
ロイシン	371	535	440	410	122	131
リジン	358	515	340	360	152	143
メチオニン・シスチン計	157	227	220	160	103	142
フェニルアラニン・チロシン計	374	539	380	390	142	138
スレオニン	188	271	250	210	108	129
トリプトファン	55	80	60	70	133	114
バリン	250	360	310	220	116	164
ヒスチジン	175	253	-	120	-	211
全窒素量(g)	0.7					

