

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	225	224	153	149
ロイシン	1.0%	391	411	274	238
リジン	0.9%	371	205	141	254
メチオニン	0.3%	128	205	133	
シスチン	0.2%	63			
メチオニン・シスチン計	0.5%	191	392	262	173
フェニルアラニン	0.5%	220	280	181	
チロシン	0.5%	186			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	405	448	298	294
スレオニン	0.5%	206	261	173	193
トリプトファン	0.2%	62	86	56	64
バリン	0.7%	273	299	197	157
ヒスチジン	0.5%	191	116	77	72
アルギニン	0.7%	287	205	141	205

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	225	290	250	180	116	161
ロイシン	391	504	440	410	115	123
リジン	371	478	340	360	141	133
メチオニン・シスチン計	191	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	405	522	380	390	137	134
スレオニン	206	266	250	210	106	126
トリプトファン	62	80	60	70	133	114
バリン	273	352	310	220	114	160
ヒスチジン	191	246	-	120	-	205
全窒素量(g)	0.8					

