



アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	255	224	177	172
ロイシン	1.0%	443	411	316	275
リジン	0.9%	410	205	163	293
メチオニン	0.3%	141	205	154	
シスチン	0.2%	74			
メチオニン・シスチン計	0.5%	215	392	303	200
フェニルアラニン	0.5%	252	280	209	
チロシン	0.5%	211			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	463	448	344	340
スレオニン	0.5%	230	261	200	223
トリプトファン	0.2%	72	86	65	74
バリン	0.7%	304	299	228	182
ヒスチジン	0.5%	214	116	88	84
アルギニン	0.7%	331	205	163	237

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	255	289	250	180
ロイシン	443	503	440	410	114	123
リジン	410	465	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	215	244	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	463	526	380	390	138	135
スレオニン	230	261	250	210	104	124
トリプトファン	72	81	60	70	135	116
バリン	304	345	310	220	111	157
ヒスチジン	214	243	-	120	-	203
全窒素量(g)	0.9					

