

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.4%	168	224	148	144
ロイシン	0.7%	289	411	265	230
リジン	0.7%	280	205	136	245
メチオニン	0.2%	97	205	128	
シスチン	0.1%	51			
メチオニン・シスチン計	0.4%	148	392	253	167
フェニルアラニン	0.4%	166	280	175	
チロシン	0.3%	134			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	300	448	288	284
スレオニン	0.4%	160	261	167	187
トリプトファン	0.1%	48	86	54	62
バリン	0.5%	199	299	191	152
ヒスチジン	0.4%	157	116	74	70
アルギニン	0.6%	236	205	136	198

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	168	282	250	180	113	156
ロイシン	289	486	440	410	110	118
リジン	280	470	340	360	138	131
メチオニン・シスチン計	148	249	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	300	503	380	390	132	129
スレオニン	160	268	250	210	107	128
トリプトファン	48	80	60	70	133	114
バリン	199	335	310	220	108	152
ヒスチジン	157	263	-	120	-	219
全窒素量(g)	0.6					

