



アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース乾燥重量ベース	AAFCO 乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	139	224	58
ロイシン	1.6%	241	411	103
リジン	1.6%	240	205	53
メチオニン	0.5%	70	205	50
シスチン	0.2%	35		
メチオニン・シスチン計	0.7%	104	392	99
フェニルアラニン	0.9%	132	280	68
チロシン	0.7%	113		
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	245	448	113
スレオニン	0.8%	122	261	65
トリプトファン	0.2%	36	86	21
バリン	1.0%	159	299	75
ヒスチジン	0.8%	122	116	29
アルギニン	1.0%	159	205	53

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	139	303	250	180
ロイシン	241	525	440	410	119	128
リジン	240	525	340	360	154	146
メチオニン・シスチン計	104	228	220	160	104	142
フェニルアラニン・チロシン計	245	536	380	390	141	137
スレオニン	122	266	250	210	107	127
トリプトファン	36	79	60	70	132	113
バリン	159	347	310	220	112	158
ヒスチジン	122	266	-	120	-	222
全窒素量(g)	0.5					

