

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.4%	152	209	139	135
ロイシン	0.7%	263	384	248	215
リジン	0.7%	256	192	128	230
メチオニン	0.2%	87	192	120	
シスチン	0.1%	39			
メチオニン・シスチン計	0.3%	126	366	237	157
フェニルアラニン	0.4%	141	262	164	
チロシン	0.3%	119			
フェニルアラニン・チロシン計	0.7%	260	419	270	266
スレオニン	0.4%	141	244	157	175
トリプトファン	0.1%	40	80	51	58
バリン	0.5%	176	279	179	142
ヒスチジン	0.3%	124	108	69	66
アルギニン	0.5%	193	192	128	186

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	152	310	250	180
ロイシン	263	539	440	410	122	131
リジン	256	525	340	360	154	146
メチオニン・シスチン計	126	258	220	160	117	161
フェニルアラニン・チロシン計	260	532	380	390	140	136
スレオニン	141	288	250	210	115	137
トリプトファン	40	82	60	70	137	117
バリン	176	361	310	220	116	164
ヒスチジン	124	255	-	120	-	212
全窒素量(g)	0.5					

