

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	167	209	138	134
ロイシン	0.8%	286	384	246	214
リジン	0.8%	276	192	127	228
メチオニン	0.2%	80	192	119	
シスチン	0.1%	43			
メチオニン・シスチン計	0.3%	121	366	235	156
フェニルアラニン	0.4%	159	262	163	
チロシン	0.4%	134			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	293	419	268	264
スレオニン	0.4%	146	244	156	174
トリプトファン	0.1%	44	80	51	58
バリン	0.5%	191	279	177	141
ヒスチジン	0.4%	129	108	69	65
アルギニン	0.5%	179	192	127	185

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	167	313	250	180	125	174
ロイシン	286	538	440	410	122	131
リジン	276	519	340	360	153	144
メチオニン・シスチン計	121	228	220	160	104	143
フェニルアラニン・チロシン計	293	551	380	390	145	141
スレオニン	146	275	250	210	110	131
トリプトファン	44	83	60	70	139	119
バリン	191	359	310	220	116	163
ヒスチジン	129	242	-	120	-	202
全窒素量(g)	0.5					

