

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	174	209	131	127
ロイシン	0.9%	299	384	234	203
リジン	0.8%	292	192	121	217
メチオニン	0.2%	86	192	114	
シスチン	0.1%	42			
メチオニン・シスチン計	0.4%	127	366	224	148
フェニルアラニン	0.5%	162	262	155	
チロシン	0.4%	139			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	301	419	255	251
スレオニン	0.4%	153	244	148	165
トリプトファン	0.1%	45	80	48	55
バリン	0.6%	199	279	169	134
ヒスチジン	0.4%	138	108	65	62
アルギニン	0.5%	184	192	121	176

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	174	320	250	180	128	178
ロイシン	299	550	440	410	125	134
リジン	292	536	340	360	158	149
メチオニン・シスチン計	127	233	220	160	106	145
フェニルアラニン・チロシン計	301	553	380	390	146	142
スレオニン	153	280	250	210	112	134
トリプトファン	45	83	60	70	138	118
バリン	199	366	310	220	118	166
ヒスチジン	138	254	-	120	-	211
全窒素量(g)	0.5					

