

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	183	209	143	140
ロイシン	0.8%	315	384	257	223
リジン	0.8%	306	192	132	238
メチオニン	0.2%	89	192	124	
シスチン	0.1%	47			
メチオニン・シスチン計	0.4%	135	366	245	162
フェニルアラニン	0.5%	173	262	170	
チロシン	0.4%	144			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	317	419	279	275
スレオニン	0.4%	162	244	162	181
トリプトファン	0.1%	48	80	53	60
バリン	0.6%	211	279	185	147
ヒスチジン	0.4%	151	108	72	68
アルギニン	0.5%	196	192	132	192

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	183	307	250	180	123	170
ロイシン	315	528	440	410	120	129
リジン	306	513	340	360	151	142
メチオニン・シスチン計	135	226	220	160	103	141
フェニルアラニン・チロシン計	317	531	380	390	140	136
スレオニン	162	271	250	210	109	129
トリプトファン	48	80	60	70	134	115
バリン	211	353	310	220	114	160
ヒスチジン	151	252	-	120	-	210
全窒素量(g)	0.6					

