

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	185	209	124	121
ロイシン	1.0%	319	384	222	193
リジン	0.9%	308	192	114	206
メチオニン	0.3%	90	192	108	
シスチン	0.1%	47			
メチオニン・シスチン計	0.4%	136	366	212	141
フェニルアラニン	0.5%	175	262	147	
チロシン	0.4%	146			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	322	419	242	239
スレオニン	0.5%	163	244	141	157
トリプトファン	0.1%	49	80	46	52
バリン	0.7%	216	279	160	127
ヒスチジン	0.5%	149	108	62	59
アルギニン	0.6%	196	192	114	167

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	185	306	250	180
ロイシン	319	528	440	410	120	129
リジン	308	510	340	360	150	142
メチオニン・シスチン計	136	225	220	160	102	141
フェニルアラニン・チロシン計	322	532	380	390	140	137
スレオニン	163	270	250	210	108	128
トリプトファン	49	81	60	70	134	115
バリン	216	357	310	220	115	162
ヒスチジン	149	247	-	120	-	205
全窒素量(g)	0.6					

