

[参考の表へ](#)

サプリメント

分数の入力方法 例:2/3→ゼロ+スペース+2

	榮養量
--	-----

米養量	米養量	米養量
-----	-----	-----

*2上限量:これ以上は危険という量

/DM: 乾燥重量あたり

は撮りましょうという

榮養量	榮養量	榮養量
-----	-----	-----

645	345	
-----	-----	--

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	168	209	119	116
ロイシン	0.9%	291	384	213	185
リジン	0.9%	288	192	110	197
メチオニン	0.3%	99	192	103	
シスチン	0.2%	49			
メチオニン・シスチン計	0.5%	148	366	204	135
フェニルアラニン	0.5%	157	262	141	
チロシン	0.4%	127			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	284	419	232	229
スレオニン	0.5%	160	244	135	150
トリプトファン	0.1%	45	80	44	50
バリン	0.6%	203	279	153	122
ヒスチジン	0.3%	99	108	60	56
アルギニン	0.7%	224	192	110	160

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	168	288	250	180	115	160
ロイシン	291	498	440	410	113	121
リジン	288	493	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	148	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	284	486	380	390	128	125
スレオニン	160	274	250	210	110	130
トリプトファン	45	77	60	70	129	110
バリン	203	347	310	220	112	158
ヒスチジン	99	169	-	120	-	141
全窒素量(g)	0.6					

