

アミノ酸(参考)					
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	211	209	149	145
ロイシン	0.9%	370	384	267	232
リジン	0.9%	349	192	137	247
メチオニン	0.3%	126	192	129	
シスチン	0.2%	61			
メチオニン・シスチン計	0.5%	188	366	255	169
フェニルアラニン	0.5%	207	262	177	
チロシン	0.4%	170			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	378	419	290	286
スレオニン	0.5%	201	244	169	188
トリプトファン	0.2%	59	80	55	63
バリン	0.7%	256	279	192	153
ヒスチジン	0.4%	156	108	75	71
アルギニン	0.7%	283	192	137	200

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	211	286	250	180
ロイシン	370	500	440	410	114	122
リジン	349	471	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	188	255	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	378	511	380	390	134	131
スレオニン	201	271	250	210	109	129
トリプトファン	59	80	60	70	133	114
バリン	256	346	310	220	112	157
ヒスチジン	156	210	-	120	-	175
全窒素量(g)	0.7					

