| | ver.4 このレシピのエネルギー | 113 | kcal 体重の0.75乗 | | | 計算では | 0.72 | 日分となり | ます | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------------|-------------------|---------------|-------|---------|---------|
| <u>参考の表へ</u> | 1日に与えるエネルギー | 158 | kcal 体 里 | 2.1 | kg | 実際は | 1.0 | 日分とする | | | | | |
| | 8/1(wed) | | このレシピで摂取できる栄養 | | | このレシピでの推奨量 *1 | | このレシピでの 推奨量 | このレシピでの 推奨量 | このレシピでの上限量 *2 | | | |
| | | グラム | 総重量 g | 111.2 | | NF | RC | AAFCO | 老齡犬用 | | N | RC | AAFCO |
| | h/d Hills prescription diet 詳細 りんご-生 | 10 10 | | 74.9 36.2 | | | 乾燥重量 | | 「小動物の 臨床栄養学」より | 疾患別推奨レベル | | | 乾燥重量 |
| 木大規 | 17/0C ± | 10 | エネルギー kcal | | | 乗ベース | ベース | ベース | ↓この範囲内↓ | ↓この範囲内↓ | 乗ベース | ベース | ベース |
| | | | エネルギー密度 | 3.1 | kcal/g | | | | 3.0 ~ 4.0 | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | /DM | /DM | /DM | /DM | /DM /DM | /DM /DM | /DM | /DM | /DM |
| | | | たんぱく質 g | 6.1 | 17% | 16% | 10% | 18% | 15.0% ~ 23.0% | ~ | | | |
| 1.00 | Beek 11 de 11 | | 内、動物性蛋白質 g | | | | | | | ~ | | | |
| | 成鶏・ささ身-生 | 6 | 脂質g | 6.0 | 16% | 9% | 6% | 5% | 7.0% ~ 15.0% | ~ | 52% | 33% | |
| | 糸引き納豆 | 3.5 | 10 1 - 22 14 | 13.6 | 38% 4.2% | | | | 0.0% | ~ | | | |
| -7-1-177 | キャベツ-生 ブロッコリー・花序-ゆで | 5.5 8 | | 1.5 2.4 | 4.2% 6.6% | | | | 2.0% ~ | ~ | | | |
| | さつまいも-蒸し | 10 | | 0.8 | 2.1% | | | | | ~ | | | |
| | 生しいたけーゆで | 8.5 | | 51 | 0.14% | 0.13% | 0.08% | 0.06% | 0.15% ~ 0.35% | 0.07% ~ 0.25% | | | |
| | にんじん・根、皮むき-ゆで | 15 | | 327 | 0.90% | 0.67% | 0.40% | 0.60% | 0.10% | ~ | | | |
| 27514750 | | | カルシウム mg | 152 | 0.42% | 0.63% | 0.40% | 0.60% | 0.50% ~ 1.00% | ~ | | | 2.5% |
| | | | マグネシウム mg | 29 | 0.080% | 0.095% | 0.060% | 0.040% | | ~ | | | 0.3% |
| 藻類 | 刻み昆布 | 0.3 | リン mg | 123 | 0.34% | 0.48% | 0.30% | 0.50% | 0.25% ~ 0.75% | 0.20% ~ 0.30% | | | 1.6% |
| 油脂類 | フラックシシードオイル | 1.5 | カルシウム:リン比 | 1.24 | : 1 | | | 1:1 | 1.2: 1 ~ 1.4:1 | ~ | | | 2:1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 乳類 | ナチュラルチース・カテーシ | 3 | Ad : | 栄養量 | | 栄養量 | | | | は摂りましょうという量 | 栄養量 | 栄養量 | 栄養量 |
| 乳類 | ヨーグルト・全脂無糖 | 20 | | 1.3 | | 2 | 1 | 3 | *2上限量:これ以上に | は危険という量 | | | 109 |
| | | | 亜鉛 mg 銅 mg | 4.8 | | 0.3 | 0.2 | 0.3 | /DM:乾燥重量 | ± +_1.1 | | | 36 9 |
| | | | 銅 mg マンガン mg | 0.1 0.2 | | 0.3 | 0.2 | 0.3 | /DM: 程深里里0 | めたり | | | 9 |
| | | | ピタレチノール IU | 86 | | 291 | 183 | 181 | | | 12194 | 7724 | 9061 |
| | | | ミン カロテン当量 IU | 381 | | 201 | 100 | | | | 12134 | //24 | 3001 |
| | | | A レチノール当量 IU | 465 | | 291 | 183 | 181 | | | 12194 | 7724 | 9061 |
| | | | ビタミンD IU | 13 | | 31 | 20 | 18 | | | 181 | 116 | 181 |
| | | | ビタミンE IU | 1.6 | | 1.7 | 1.1 | 1.8 | | | | | 36 |
| | | | ビタミンK μg | 39 | | 94 | 59 | | | | | | |
| | | | ビタミンB1 mg | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | | | | |
| | | | ビタミンB2 mg | 0.1 | | 0.3 | 0.2 | 0.1 | | | | | |
| | | | ナイアシン mg | 1.4 | | 1.0 | 0.6 | 0.4 | | | | | |
| _ | | | ビタミンB6 mg ビタミンB12 μg | 0.14 | | 0.09 | 0.05 | 0.04 | | | | | |
| _ | | | ビタミンB12 μg 葉酸 μg | 36 | | 2.0 | 1.3 | 0.8 7 | | | | | |
| | | 錠•杯 | パントテン酸 mg | 0.8 | | 0.9 | 0.5 | 0.4 | | | | | |
| | 新ビオフェルミンS | 2 | ビタミンC mg | 109 | | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | | | | |
| | | | コレステロール mg | 6 | | | | | | | | | |
| 1 | 新ビオフェルミンS | 2 | 食塩相当量 g | 0.1 | | | | | | | | | |
| サプ | Asahi エビオス錠 | 1 | 飽和g | 0.7 | | | | | | | | | |
| IJ | ワダカルシューム末 | 0.15 | 一価不飽和 g | 0.6 | | | | | | | | | |
| メン | ZINC lifestyle | 0.1 | 多価不飽和 g | 1.2 | | | | | | | | | |
| 1 7 | Asahi Dear-Natura ノコギリヤシ | 1 | III n−3 mg | 830 | | | | | | | | | |
| | LULE-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- | | 肪 n-b i mg | 402 | | | | | | | ļ | | ļ |
| | 岩城製薬ビタミンC アスコルビンスパイラルエンザイム生酵素 | _ | HX | 0.5 506 | : 1 | 628 | 399 | 362 | | | 3663 | 2356 | |
| | ヘハイフルエンザイム生酵系 | 2 | リノール酸 mg αリノレン酸 mg | 829 | | 24 | 16 | 302 | | | 3003 | 2300 | |
| | | | EPA+DHA mg | 029 | | 24 | 16 | | | | 645 | 399 | |
| | | | EPA : DHA mg | 0.4 | : 1 | 1:1 | 1:1 | | | | | 1.5 : 1 | |
| | | 1 | | • | | | | | | | 1 | | |

| アミノ酸(参考) | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|------------|---------|--------|--|--|--|
| このレシピで | 担刑不主 | - z = | このレシピでの推奨量 | | | | | |
| | TERN CO | の里 | N | AAFCO | | | | |
| | /DM | mg | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 12深里里へ | | | |
| イソロイシン | 0.5% | 191 | 209 | 138 | 134 | | | |
| ロイシン | 0.9% | 327 | 384 | 246 | 214 | | | |
| リジン | 0.9% | 318 | 192 | 127 | 228 | | | |
| メチオニン | 0.3% | 93 | 192 | 120 | | | | |
| シスチン | 0.1% | 50 | | | | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.4% | 142 | 366 | 236 | 156 | | | |
| フェニルアラニン | 0.5% | 180 | 262 | 163 | | | | |
| チロシン | 0.4% | 149 | | | | | | |
| フェニルアラニン・チロシン言 | 0.9% | 330 | 419 | 268 | 265 | | | |
| スレオニン | 0.5% | 171 | 244 | 156 | 174 | | | |
| トリプトファン | 0.1% | 51 | 80 | 51 | 58 | | | |
| バリン | 0.6% | 222 | 279 | 178 | 141 | | | |
| ヒスチジン | 0.4% | 148 | 108 | 69 | 65 | | | |
| アルギニン | 0.6% | 209 | 192 | 127 | 185 | | | |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | | | | |
|----------------|------|----------|-------|--------|-----------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| このレシピで摂取 | できる量 | 窒素1gあたりの | | 点パタン | アミノ酸スコアを計算する(%) | | | | |
| | | アミノ酸量 | 1973年 | 1985年 | 1973年 | 1985年 | | | |
| (mg) | | , | (一般用) | (2−5歳) | (一般用) | (2-5歳) | | | |
| イソロイシン | 191 | 303 | 250 | 180 | 121 | 169 | | | |
| ロイシン | 327 | 519 | 440 | 410 | 118 | 127 | | | |
| リジン | 318 | 505 | 340 | 360 | 148 | 140 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 142 | 225 | 220 | 160 | 102 | 141 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 330 | 524 | 380 | 390 | 138 | 134 | | | |
| スレオニン | 171 | 271 | 250 | 210 | 109 | 129 | | | |
| トリプトファン | 51 | 81 | 60 | 70 | 135 | 115 | | | |
| バリン | 222 | 353 | 310 | 220 | 114 | 161 | | | |
| ヒスチジン | 148 | 236 | - | 120 | - | 196 | | | |
| 全窒素量(g) | 0.6 | | | | | | | | |

