

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	235	209	169	165
ロイシン	0.9%	403	384	303	263
リジン	0.8%	364	192	156	281
メチオニン	0.3%	121	192	147	
シスチン	0.2%	73			
メチオニン・シスチン計	0.4%	193	366	290	192
フェニルアラニン	0.5%	229	262	200	
チロシン	0.4%	184			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	413	419	330	325
スレオニン	0.5%	213	244	192	214
トリプトファン	0.2%	67	80	62	71
バリン	0.6%	279	279	218	174
ヒスチジン	0.4%	178	108	85	80
アルギニン	0.7%	326	192	156	227

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	235	283	250	180	113	157
ロイシン	403	484	440	410	110	118
リジン	364	437	340	360	129	121
メチオニン・シスチン計	193	232	220	160	105	145
フェニルアラニン・チロシン計	413	496	380	390	131	127
スレオニン	213	256	250	210	102	122
トリプトファン	67	81	60	70	135	116
バリン	279	335	310	220	108	152
ヒスチジン	178	214	-	120	-	178
全窒素量(g)	0.8					

