| | ver.4 このレシピのエネルギー | 140 | kcal 体重の0.75乗 | 1.74 | kg | | | 日分となり | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------------|--------------|---------------|---------|-------------|----------------|-------------------|---------------|---------|------|-------|
| <u>参考の表へ</u> | 1日に与えるエネルギー | 158 | kcal 体 重 | 2.1 | kg | 実際は | 1.0 | 日分とする | 5 | | | | |
| | 8/4(sat) | | このレシピで摂取できる栄養 | | このレシピでの推奨量 *1 | | このレシピでの 推奨量 | このレシピでの 推奨量 | このレシピでの上限量 *2 | | | | |
| | | グラム | 総重量 g | 121.1 | | NF | RC | AAFCO | 老齢犬用 | | N | RC | AAFCO |
| | h/d Hills prescription diet 詳細 バナナー生 | 10 10 | | 80.6 40.5 | | | 乾燥重量 | | 「小動物の 臨床栄養学」より | 疾患別推奨レベル | | | 乾燥重量 |
| | キャベツ-生 | 3 | | | | 乗べ一ス | ベース | ベース | ↓この範囲内↓ | ↓この範囲内↓ | 乗ベース | ベース | ベース |
| | ごま-いり | 2 | | | kcal/g | | | | 3.0 ~ 4.0 | ~ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | /DM | /DM | /DM | /DM | /DM /DM | /DM /DM | /DM | /DM | /DM |
| | | | たんぱく質 g | 7.3 | 18% | 14% | 10% | 18% | 15.0% ~ 23.0% | ~ | | | |
| | | | 内、動物性蛋白質 g | | | | | | | ~ | | | |
| | ぶり・成魚-焼き | 8 | | 8.5 | 21% | 8% | 6% | 5% | 7.0% ~ 15.0% | ~ | 46% | 33% | |
| | 糸引き納豆 | 3 5 | 646 - 345 M | 14.1 | 35% 4.8% | | | | 2.0% ~ | ~ | | | |
| | キャベツ-生 きゅうり-生 | 8.5 | 6H | 2.9 | 4.8% 7.0% | | | | 2.0% ~ | ~ | | | |
| | さつまいも-蒸し | 10 | | 1.1 | 2.8% | | | | | ~ | | | |
| | トマト・ミニトマト-生 | 11.5 | | 39 | 0.10% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.15% ~ 0.35% | 0.07% ~ 0.25% | | | |
| | にんじん・根、皮むき-ゆで | 9.5 | | 419 | 1.03% | 0.60% | 0.40% | 0.60% | 0.10% | ~ | | | |
| | 生しいたけーゆで | 8 | | 225 | 0.56% | 0.56% | 0.40% | 0.60% | 0.50% ~ 1.00% | ~ | | | 2.5% |
| 野菜類 | しそ・葉-生 | 1.4 | マグネシウム mg | 52 | 0.129% | 0.085% | 0.060% | 0.040% | | ~ | | | 0.3% |
| 藻類 | 刻み昆布 | 0.3 | リン mg | 150 | 0.37% | 0.43% | 0.30% | 0.50% | 0.25% ~ 0.75% | 0.20% ~ 0.30% | | | 1.6% |
| 種実類 | ごま-いり | 3 | カルシウム:リン比 | 1.50 | : 1 | | | 1:1 | 1.2: 1 ~ 1.4:1 | ~ | | | 2:1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 栄養量 | | | 栄養量 | | | は摂りましょうという量 | 栄養量 | 栄養量 | |
| 乳類 | ヨーグルト・全脂無糖 | 20 | 鉄 mg | 2.0 | | 2 | 1 | 3 | *2上限量:これ以上に | は危険という量 | | | 122 |
| - | | | 亜 鉛 mg 銅 mg | 5.0 | | 3 | 2 | 5 | /DM . | t +.11 | | | 41 |
| - | | | | 0.2 | | 0.3 | 0.2 | 0.3 | /DM: 乾燥重量 | めたり | | | 10 |
| _ | | | マンガン mg ピタ レチノール IU | 92 | | 291 | 204 | 203 | | | 12194 | 8637 | 10132 |
| | | | ミン・カロテン当量 IU | 315 | | 231 | 204 | 203 | | | 12134 | | 10132 |
| | | | A レチノール当量 IU | 403 | | 291 | 204 | 203 | | | 12194 | 8637 | 10132 |
| | | | ビタミンD IU | 30 | | 31 | 22 | 20 | | | 181 | 130 | 203 |
| | | | ビタミンE IU | 1.7 | | 1.7 | 1.2 | 2.0 | | | | | 41 |
| | | | ビタミンK μg | 39 | | 94 | 66 | | | | | | |
| | | | ビタミンB1 mg | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | | | | |
| | | | ビタミンB2 mg | 0.2 | | 0.3 | 0.2 | 0.1 | | | | | |
| | | | ナイアシン mg | 1.9 | | 1.0 | 0.7 | 0.5 | | | | | |
| | | | ビタミンB6 mg ビタミンB12 ug | 0.20 | | 0.09 | 0.06 | 0.04 | | | | | |
| | | | ビタミンB12 μg 葉酸 μg | 44 | | 16 | 1.4 | 0.9 7 | | | | | |
| | | 錠∙杯 | パントテン酸 mg | 0.8 | | 0.9 | 0.6 | 0.4 | | | | | |
| | 新ビオフェルミンS | 2 | II | 113 | | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | | | | |
| | | | コレステロール mg | 10 | | | | | | | | | |
| ++ | 新ビオフェルミンS | 2 | 食塩相当量 g | 0.1 | | | | | | | | | |
| ププ | Asahi エビオス錠 | 1 | 飽和 g | 1.2 | | | | | | | | | |
| IJ | ワダカルシューム末 | 0.2 | | 1.6 | | | | | | | | | |
| メン | ZINC lifestyle | 0.1 | | 1.7 | | | | | | | | | |
| | Asahi Dear-Natura ノコギリヤシ | | | 333 | | | | | | | | | |
| | 岩城製薬ビタミンC アスコルビン | 0.1 | 肪 n-b i mg | 1369 | | | | | | | | | |
| | | | m-6:n-3 リノール酸 mg | 4.1 1447 | : 1 | 628 | 446 | 405 | | | 3663 | 2634 | |
| | <u> </u> | | リノール酸 mg αリノレン酸 mg | 43 | | 24 | 18 | 400 | | | 3003 | 2034 | |
| | | | EPA+DHA mg | 233 | | 24 | 18 | | | | 645 | 446 | |
| | | | EPA : DHA mg | 0.5 | : 1 | 1:1 | 1:1 | | | | 1.5 : 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| アミノ酸(参考) | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|------------|---------|--------|--|--|--|
| このレシピで | 垣面でき | - 조 문 | このレシピでの推奨量 | | | | | |
| | DO XRXC | る里 | NF | AAFCO | | | | |
| | /DM | mg | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 乳深里里へ― | | | |
| イソロイシン | 0.6% | 230 | 209 | 154 | 150 | | | |
| ロイシン | 1.0% | 390 | 384 | 276 | 239 | | | |
| リジン | 0.9% | 356 | 192 | 142 | 255 | | | |
| メチオニン | 0.3% | 140 | 192 | 134 | | | | |
| シスチン | 0.2% | 77 | | | | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.5% | 218 | 366 | 263 | 174 | | | |
| フェニルアラニン | 0.6% | 226 | 262 | 182 | | | | |
| チロシン | 0.4% | 179 | | | | | | |
| フェニルアラニン・チロシン言 | 1.0% | 406 | 419 | 300 | 296 | | | |
| スレオニン | 0.5% | 214 | 244 | 174 | 195 | | | |
| トリプトファン | 0.2% | 69 | 80 | 57 | 65 | | | |
| バリン | 0.7% | 274 | 279 | 199 | 158 | | | |
| ヒスチジン | 0.6% | 253 | 108 | 77 | 73 | | | |
| アルギニン | 0.8% | 343 | 192 | 142 | 207 | | | |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|-------|--------|-----------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| このレシピで摂取 | できる量 | 窒素1gあたりの | 算定用評 | 点パタン | アミノ酸スコアを計算する(%) | | | | |
| CODD C CIRCUX | CC.0= | アミノ酸量 | 1973年 | 1985年 | 1973年 | 1985年 | | | |
| | (mg) | | (一般用) | (2−5歳) | (一般用) | (2−5歳) | | | |
| イソロイシン | 230 | 274 | 250 | 180 | 110 | 152 | | | |
| ロイシン | 390 | 464 | 440 | 410 | 106 | 113 | | | |
| リジン | 356 | 425 | 340 | 360 | 125 | 118 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 218 | 260 | 220 | 160 | 118 | 162 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 406 | 483 | 380 | 390 | 127 | 124 | | | |
| スレオニン | 214 | 255 | 250 | 210 | 102 | 121 | | | |
| トリプトファン | 69 | 82 | 60 | 70 | 137 | 117 | | | |
| バリン | 274 | 326 | 310 | 220 | 105 | 148 | | | |
| ヒスチジン | 253 | 301 | - | 120 | - | 251 | | | |
| 全窒素量(g) | 0.8 | | | | | | | | |

