

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	205	209	138	135
ロイシン	1.0%	350	384	248	215
リジン	0.9%	344	192	127	229
メチオニン	0.3%	108	192	120	
シスチン	0.2%	55			
メチオニン・シスチン計	0.4%	163	366	237	157
フェニルアラニン	0.5%	195	262	164	
チロシン	0.4%	162			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	357	419	269	266
スレオニン	0.5%	187	244	157	175
トリプトファン	0.2%	55	80	51	58
バリン	0.7%	238	279	178	142
ヒスチジン	0.5%	172	108	69	66
アルギニン	0.7%	250	192	127	186

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	205	296	250	180	119	165
ロイシン	350	507	440	410	115	124
リジン	344	498	340	360	147	138
メチオニン・シスチン計	163	236	220	160	107	147
フェニルアラニン・チロシン計	357	516	380	390	136	132
スレオニン	187	270	250	210	108	129
トリプトファン	55	80	60	70	133	114
バリン	238	344	310	220	111	156
ヒスチジン	172	250	-	120	-	208
全窒素量(g)	0.7					

