

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	229	209	162	158
ロイシン	0.9%	389	384	290	252
リジン	0.8%	340	192	149	269
メチオニン	0.3%	139	192	141	
シスチン	0.2%	78			
メチオニン・シスチン計	0.5%	218	366	277	184
フェニルアラニン	0.5%	222	262	192	
チロシン	0.4%	183			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	404	419	316	312
スレオニン	0.5%	208	244	184	205
トリプトファン	0.1%	64	80	60	68
バリン	0.7%	281	279	209	166
ヒスチジン	0.4%	165	108	81	77
アルギニン	0.7%	296	192	149	218

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	229	290	250	180	116	161
ロイシン	389	494	440	410	112	120
リジン	340	432	340	360	127	120
メチオニン・シスチン計	218	276	220	160	125	172
フェニルアラニン・チロシン計	404	513	380	390	135	132
スレオニン	208	263	250	210	105	125
トリプトファン	64	81	60	70	135	116
バリン	281	357	310	220	115	162
ヒスチジン	165	209	-	120	-	175
全窒素量(g)	0.8					

