

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	174	209	130	126
ロイシン	0.9%	294	384	232	201
リジン	0.8%	287	192	119	215
メチオニン	0.3%	90	192	113	
シスチン	0.1%	41			
メチオニン・シスチン計	0.4%	130	366	222	147
フェニルアラニン	0.4%	152	262	154	
チロシン	0.4%	131			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	283	419	252	249
スレオニン	0.4%	153	244	147	164
トリプトファン	0.1%	42	80	48	55
バリン	0.6%	196	279	167	133
ヒスチジン	0.4%	139	108	65	61
アルギニン	0.5%	182	192	119	174

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	174	313	250	180	125	174
ロイシン	294	529	440	410	120	129
リジン	287	517	340	360	152	144
メチオニン・シスチン計	130	233	220	160	106	146
フェニルアラニン・チロシン計	283	510	380	390	134	131
スレオニン	153	276	250	210	110	131
トリプトファン	42	76	60	70	127	109
バリン	196	353	310	220	114	160
ヒスチジン	139	251	-	120	-	209
全窒素量(g)	0.6					

