

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	190	209	158	154
ロイシン	0.8%	326	384	283	245
リジン	0.8%	318	192	146	262
メチオニン	0.2%	93	192	137	
シスチン	0.1%	48			
メチオニン・シスチン計	0.3%	140	366	270	179
フェニルアラニン	0.4%	178	262	187	
チロシン	0.4%	148			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	326	419	308	304
スレオニン	0.4%	167	244	179	200
トリプトファン	0.1%	50	80	58	67
バリン	0.5%	218	279	204	162
ヒスチジン	0.4%	157	108	79	75
アルギニン	0.5%	208	192	146	212

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	190	304	250	180	122	169
ロイシン	326	522	440	410	119	127
リジン	318	509	340	360	150	141
メチオニン・シスチン計	140	224	220	160	102	140
フェニルアラニン・チロシン計	326	522	380	390	137	134
スレオニン	167	268	250	210	107	128
トリプトファン	50	79	60	70	132	113
バリン	218	349	310	220	112	158
ヒスチジン	157	252	-	120	-	210
全窒素量(g)	0.6					

