

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	192	209	157	153
ロイシン	0.8%	332	384	282	244
リジン	0.8%	323	192	145	261
メチオニン	0.2%	93	192	137	
シスチン	0.1%	50			
メチオニン・シスチン計	0.3%	143	366	269	178
フェニルアラニン	0.4%	182	262	186	
チロシン	0.4%	151			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	334	419	307	302
スレオニン	0.4%	173	244	178	199
トリプトファン	0.1%	51	80	58	66
バリン	0.5%	224	279	203	162
ヒスチジン	0.4%	150	108	79	75
アルギニン	0.5%	212	192	145	211

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	192	309	250	180	124	172
ロイシン	332	533	440	410	121	130
リジン	323	519	340	360	153	144
メチオニン・シスチン計	143	229	220	160	104	143
フェニルアラニン・チロシン計	334	536	380	390	141	137
スレオニン	173	279	250	210	111	133
トリプトファン	51	83	60	70	138	118
バリン	224	360	310	220	116	164
ヒスチジン	150	241	-	120	-	201
全窒素量(g)	0.6					

