

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	200	209	144	140
ロイシン	0.9%	347	384	258	223
リジン	0.9%	328	192	133	239
メチオニン	0.3%	117	192	125	
シスチン	0.2%	61			
メチオニン・シスチン計	0.5%	178	366	246	163
フェニルアラニン	0.5%	196	262	170	
チロシン	0.4%	158			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	353	419	280	277
スレオニン	0.5%	192	244	163	182
トリプトファン	0.2%	57	80	53	61
バリン	0.6%	240	279	186	148
ヒスチジン	0.5%	184	108	72	68
アルギニン	0.7%	258	192	133	193

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	200	288	250	180	115	160
ロイシン	347	498	440	410	113	121
リジン	328	471	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	178	255	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	353	508	380	390	134	130
スレオニン	192	276	250	210	110	131
トリプトファン	57	82	60	70	136	117
バリン	240	345	310	220	111	157
ヒスチジン	184	264	-	120	-	220
全窒素量(g)	0.7					

