

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	219	209	146	142
ロイシン	1.0%	382	384	260	226
リジン	0.9%	361	192	134	241
メチオニン	0.3%	126	192	126	
シスチン	0.2%	63			
メチオニン・シスチン計	0.5%	189	366	249	165
フェニルアラニン	0.6%	215	262	172	
チロシン	0.5%	179			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	394	419	283	280
スレオニン	0.5%	204	244	165	184
トリプトファン	0.2%	61	80	54	61
バリン	0.7%	265	279	188	149
ヒスチジン	0.5%	196	108	73	69
アルギニン	0.7%	271	192	134	195

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	219	290	250	180	116	161
ロイシン	382	505	440	410	115	123
リジン	361	477	340	360	140	132
メチオニン・シスチン計	189	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	394	521	380	390	137	133
スレオニン	204	270	250	210	108	129
トリプトファン	61	81	60	70	135	116
バリン	265	350	310	220	113	159
ヒスチジン	196	260	-	120	-	216
全窒素量(g)	0.8					

