

アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース乾燥重量ベース	AAFCO 乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	196	209	146
ロイシン	0.9%	338	384	261
リジン	0.8%	311	192	135
メチオニン	0.3%	115	192	127
シスチン	0.2%	64		
メチオニン・シスチン計	0.5%	178	366	250
フェニルアラニン	0.5%	194	262	173
チロシン	0.4%	156		
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	350	419	285
スレオニン	0.5%	186	244	165
トリプトファン	0.1%	58	80	54
バリン	0.6%	234	279	188
ヒスチジン	0.5%	176	108	73
アルギニン	0.7%	270	192	135

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	196	274	250	180
ロイシン	338	470	440	410	107	115
リジン	311	434	340	360	128	120
メチオニン・シスチン計	178	249	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	350	488	380	390	128	125
スレオニン	186	260	250	210	104	124
トリプトファン	58	80	60	70	134	115
バリン	234	327	310	220	105	149
ヒスチジン	176	245	-	120	-	204
全窒素量(g)	0.7					

