

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	215	209	159	155
ロイシン	0.9%	369	384	285	247
リジン	0.8%	342	192	147	264
メチオニン	0.3%	125	192	138	
シスチン	0.2%	69			
メチオニン・シスチン計	0.5%	194	366	273	180
フェニルアラニン	0.5%	212	262	189	
チロシン	0.4%	171			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	384	419	310	306
スレオニン	0.5%	203	244	180	201
トリプトファン	0.1%	63	80	59	67
バリン	0.6%	255	279	206	164
ヒスチジン	0.5%	194	108	80	75
アルギニン	0.7%	292	192	147	214

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	215	277	250	180	111	154
ロイシン	369	476	440	410	108	116
リジン	342	441	340	360	130	123
メチオニン・シスチン計	194	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	384	495	380	390	130	127
スレオニン	203	261	250	210	105	124
トリプトファン	63	81	60	70	134	115
バリン	255	328	310	220	106	149
ヒスチジン	194	251	-	120	-	209
全窒素量(g)	0.8					

