

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

分数の入力方法 例:2/3→ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	209	209	149	145
ロイシン	0.9%	356	384	267	232
リジン	0.9%	348	192	137	247
メチオニン	0.3%	100	192	130	
シスチン	0.1%	55			
メチオニン・シスチン計	0.4%	154	366	255	169
フェニルアラニン	0.5%	197	262	177	
チロシン	0.4%	164			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	361	419	291	287
スレオニン	0.5%	185	244	169	188
トリプトファン	0.1%	55	80	55	63
バリン	0.6%	238	279	192	153
ヒスチジン	0.4%	165	108	75	71
アルギニン	0.6%	229	192	137	200

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	209	303	250	180	121	168
ロイシン	356	517	440	410	118	126
リジン	348	506	340	360	149	141
メチオニン・シスチン計	154	224	220	160	102	140
フェニルアラニン・チロシン計	361	524	380	390	138	134
スレオニン	185	269	250	210	108	128
トリプトファン	55	80	60	70	134	115
バリン	238	346	310	220	111	157
ヒスチジン	165	240	-	120	-	200
全窒素量(g)	0.7					

