

アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	208	209	154	150
ロイシン	0.9%	357	384	275	238
リジン	0.8%	337	192	141	255
メチオニン	0.3%	122	192	133	
シスチン	0.2%	71			
メチオニン・シスチン計	0.5%	194	366	263	174
フェニルアラニン	0.5%	205	262	182	
チロシン	0.4%	163			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	368	419	299	295
スレオニン	0.5%	193	244	174	194
トリプトファン	0.2%	65	80	57	65
バリン	0.6%	251	279	198	158
ヒスチジン	0.6%	252	108	77	73
アルギニン	0.7%	288	192	141	206

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	208	271	250	180
ロイシン	357	466	440	410	106	114
リジン	337	440	340	360	129	122
メチオニン・シスチン計	194	253	220	160	115	158
フェニルアラニン・チロシン計	368	480	380	390	126	123
スレオニン	193	252	250	210	101	120
トリプトファン	65	85	60	70	142	122
バリン	251	328	310	220	106	149
ヒスチジン	252	329	-	120	-	275
全窒素量(g)	0.8					

