



アミノ酸(参考)				
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	207	209	152
ロイシン	0.9%	359	384	271
リジン	0.9%	345	192	140
メチオニン	0.3%	101	192	132
シスチン	0.1%	52		
メチオニン・シスチン計	0.4%	151	366	259
フェニルアラニン	0.5%	195	262	179
チロシン	0.4%	165		
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	361	419	295
スレオニン	0.5%	184	244	172
トリプトファン	0.1%	55	80	56
バリン	0.6%	242	279	195
ヒスチジン	0.4%	157	108	76
アルギニン	0.5%	216	192	140

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	207	316	250	180
ロイシン	359	549	440	410	125	134
リジン	345	527	340	360	155	147
メチオニン・シスチン計	151	231	220	160	105	145
フェニルアラニン・チロシン計	361	551	380	390	145	141
スレオニン	184	281	250	210	112	134
トリプトファン	55	83	60	70	139	119
バリン	242	370	310	220	119	168
ヒスチジン	157	240	-	120	-	200
全窒素量(g)	0.7					

