

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.1%	19	209	122	118
ロイシン	0.1%	35	384	218	189
リジン	0.1%	35	192	112	202
メチオニン	0.0%	8	192	106	
シスチン	0.0%	7			
メチオニン・シスチン計	0.0%	15	366	208	138
フェニルアラニン	0.1%	23	262	144	
チロシン	0.0%	14			
フェニルアラニン・チロシン計	0.1%	37	419	237	234
スレオニン	0.1%	25	244	138	154
トリプトファン	0.0%	7	80	45	51
バリン	0.1%	29	279	157	125
ヒスチジン	0.0%	13	108	61	58
アルギニン	0.1%	27	192	112	163

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	19	360	250	180	144	200
ロイシン	35	667	440	410	152	163
リジン	35	671	340	360	197	186
メチオニン・シスチン計	15	296	220	160	135	185
フェニルアラニン・チロシン計	37	713	380	390	188	183
スレオニン	25	482	250	210	193	229
トリプトファン	7	132	60	70	220	188
バリン	29	555	310	220	179	252
ヒスチジン	13	244	-	120	-	203
全窒素量(g)	0.1					

