

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.2%	56	209	135	131
ロイシン	0.3%	102	384	241	209
リジン	0.2%	86	192	124	223
メチオニン	0.1%	27	192	117	
シスチン	0.0%	11			
メチオニン・シスチン計	0.1%	38	366	230	152
フェニルアラニン	0.2%	58	262	159	
チロシン	0.1%	52			
フェニルアラニン・チロシン計	0.3%	110	419	262	259
スレオニン	0.1%	47	244	152	170
トリプトファン	0.0%	14	80	50	57
バリン	0.2%	74	279	174	138
ヒスチジン	0.1%	33	108	67	64
アルギニン	0.1%	41	192	124	181

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	56	350	250	180	140	195
ロイシン	102	642	440	410	146	157
リジン	86	544	340	360	160	151
メチオニン・シスチン計	38	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	110	691	380	390	182	177
スレオニン	47	295	250	210	118	141
トリプトファン	14	91	60	70	151	130
バリン	74	465	310	220	150	211
ヒスチジン	33	205	-	120	-	171
全窒素量(g)	0.2					

