| | ver.4 このレシピのエネルギー | 136 | kcal 体重の0.75乗 1.74 kg | | 計算では 0.86 日分となります | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------|--|------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------|--|
| 参考の表へ | 1日に与えるエネルギー | 158 | kcal 体 | 重 2.1 | kg | 実際は | 1.0 | 日分とする | 5 | | | | |
| | 9/30(sun) | | このレシピで摂取できる栄養 | | | このレシピでの推奨量 *1 | | このレシピでの 推奨量 | このレシピでの 推奨量 | このレシピでの上限量 *2 | | | |
| | | グラム | 総重量 g 120.3 | | NRC AAFCO | | 老齢犬用 | | NRC AAFCC | | AAFCO | | |
| - | h/d Hills prescription diet 詳細 | | | g 80.4 | | 体重0.75 | 乾燥重量 | 乾燥重量 | 「小動物の 臨床栄養学」より | 疾患別推奨レベル | 体重0.75 | 乾燥重量 | 乾燥重量 |
| | キャベツ-生 にんじん・根、皮むき-ゆで | 8 15 | 乾燥重量 エネルギー | g 39.9 | | 乗べース | ベース | ベース | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | ↓この範囲内↓ | 乗べース | ベース | ベース |
| | ブルーベリー-生 | 6 | エネルギー密度 | | kcal/g | | | | 3.0 ~ 4.0 | ↓ CO7配因内↓ ~ | | | |
| *** | 770 17 1 | | 111 1112 | 1 0.4 | Roul/ g | | | | 0.0 | | | | - |
| | | | | | /DM | /DM | /DM | /DM | /DM /DM | /DM /DM | /DM | /DM | /DM |
| いも類 | さつまいも-蒸し | 10 | | g 6.3 | 16% | 14% | 10% | 18% | 15.0% ~ 23.0% | ~ | | | |
| 10 to 0 1 | . / | 40.4 | 内、動物性蛋白質 | g | 100 | | 00/ | - F0/ | 7.00 | ~ | | 0.00/ | |
| | h/d Hills prescription diet 詳細 枯 | 10.1 | 脂 質 可溶性炭水化物 | g 7.0 g 19.8 | | 8% | 6% | 5% | 7.0% ~ 15.0% | ~ | 47% | 33% | |
| | なす-ゆで | 10 | | g 13.0 | | | | | 2.0% ~ | ~ | | | |
| 21200 | 07.70 | | 維総量 | g 2.2 | | | | | 2.0% | ~ | | | |
| 乳類 | ヨーグルト・全脂無糖 | 20 | | g 0.6 | 1.5% | | | | | ~ | | | |
| | ナチュラルチース・カテーシ゛ | 5 | | mg 52 | | 0.11% | 0.08% | 0.06% | 0.15% ~ 0.35% | 0.07% ~ 0.25% | | | |
| 追加食品 | 鹿肉五膳 ライト | 1.2 | | mg 364 | 0.91% | 0.61% | 0.40% | 0.60% | | ~ | | | |
| - | | | カルシウム | mg 187 | 0.47% | 0.57% | 0.40% | 0.60% | 0.50% ∼ 1.00% | ~ | | | 2.5% |
| | | | マグネシウム リン | mg 36 | | 0.086% | 0.060% | 0.040% 0.50% | 0.25% ~ 0.75% | 0.20% ~ 0.30% | | | 0.3% 1.6% |
| | | | カルシウム:リン | | | 0.44/0 | 0.30% | 1:1 | 1.2: 1 ~ 1.4: 1 | ~ | | | 2:1 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | 栄養量 | | 栄養量 | 栄養量 | 栄養量 | *1推奨量:このくらい | は摂りましょうという量 | 栄養量 | 栄養量 | 栄養量 |
| | | | 鉄 | mg 2.1 | | 2 | 1 | 3 | *2上限量:これ以上に | は危険という量 | | | 120 |
| | | | 亜 鉛 | mg 2.9 | | 3 | 2 | 5 | #UZZZ | . | | | 40 |
| | | | 卸 マンガン | mg 0.2 | | 0.3 | 0.2 | 0.3 | /DM:乾燥重量 | あたり | | | 10 |
| - | | | ピタレチノール | mg 0.3 IU 147 | | 0.3 291 | 0.2 202 | 200 | | | 12194 | 8513 | 9986 |
| | | | ミンカロテン当量 | IU 391 | | 231 | 202 | 200 | | | 12134 | 0010 | 3300 |
| | | | A レチノール当量 | IU 559 | | 291 | 202 | 200 | | | 12194 | 8513 | 9986 |
| | | | ビタミンD | IU 11 | | 31 | 22 | 20 | | | 181 | 128 | 200 |
| | | | ビタミンE | IU 1.7 | | 1.7 | 1.2 | 2.0 | | | | | 40 |
| | | | ビタミンK | μg 8 | | 94 | 65 | | | | | | |
| - | | | ビタミンB1 ビタミンB2 | mg 0.7 | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | | | | |
| _ | | | ナイアシン | mg 0.1 mg 0.7 | | 1.0 | 0.2 | 0.1 | | | | | |
| | | | ビタミンB6 | mg 0.11 | | 0.09 | 0.06 | 0.04 | | | | | |
| | | | ビタミンB12 | μg 0.6 | | 2.0 | 1.4 | 0.9 | | | | | |
| | | | 葉酸 | μg 33 | | 16 | 11 | 7 | | | | | |
| | | 錠∙杯 | パントテン酸 | mg 0.6 | 4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | | | | | |
| | 新ビオフェルミンS | 2 | ビタミンC コレステロール | mg 420 | | l—— | | | | | | | |
| | 岩城製薬ビタミンC アスコルビン Asahi エビオス錠 | 0.2 | 食塩相当量 | mg 3 g 0.1 | _ | l | | | | | | | |
| サプ | ASalii 工L 7 八乘 | | 飽和 | g 0.1 | | | | | | | | | |
| Ú | 新ビオフェルミンS | 2 | 一価不飽和 | g 0.2 | | | | | | | | | (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |
| × | 岩城製薬ビタミンC アスコルビン | 0.2 | 多価不飽和 | g 0.0 | | | | | | | | | |
| レント | Asahi エビオス錠 | 1 | | mg 5 | | | | | | | | | |
| 1 | | | 肪 i | mg 27 | 1 | | | | | | ļ | | ļ |
| 1 | | | m-6:n-i | mg 242 | : 1 | 628 | 439 | 399 | | | 3663 | 2596 | |
| <u> </u> | <u> </u> | | αリノレン酸 αリノレン酸 | | | 24 | 18 | 299 | | | 3003 | 2090 | |
| | | | | mg 1 | | 24 | 18 | | | | 645 | 439 | |
| | | | EPA : DHA | | : 1 | 1:1 | 1:1 | | | | 1.5 : 1 | 1.5 : 1 | |
| | | 1 | | | | | | | • | | | | |

| アミノ酸(参考) | | | | | | | | |
|----------------|---------|-------|------------|---------|-------------|--|--|--|
| このレシピで | 担刑不主 | - z = | このレシピでの推奨量 | | | | | |
| | TERN CO | の里 | N | AAFCO | | | | |
| | /DM | mg | 体重0.75乗ベース | 乾燥重量ベース | 以深里里へー フ | | | |
| イソロイシン | 0.2% | 93 | 209 | 152 | 148 | | | |
| ロイシン | 0.4% | 169 | 384 | 272 | 236 | | | |
| リジン | 0.4% | 146 | 192 | 140 | 252 | | | |
| メチオニン | 0.1% | 44 | 192 | 132 | | | | |
| シスチン | 0.0% | 19 | | | | | | |
| メチオニン・シスチン計 | 0.2% | 63 | 366 | 260 | 172 | | | |
| フェニルアラニン | 0.2% | 94 | 262 | 180 | | | | |
| チロシン | 0.2% | 83 | | | | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | 0.4% | 177 | 419 | 296 | 292 | | | |
| スレオニン | 0.2% | 80 | 244 | 172 | 192 | | | |
| トリプトファン | 0.1% | 25 | 80 | 56 | 64 | | | |
| バリン | 0.3% | 122 | 279 | 196 | 156 | | | |
| ヒスチジン | 0.1% | 53 | 108 | 76 | 72 | | | |
| アルギニン | 0.2% | 74 | 192 | 140 | 204 | | | |

| アミノ酸スコア(参考) | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------|-------|--------|-----------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| このレシピで摂取 | できる量 | 窒素1gあたりの | 算定用計 | 点パタン | アミノ酸スコアを計算する(%) | | | | |
| | OI | アミノ酸量 | 1973年 | 1985年 | 1973年 | 1985年 | | | |
| | (mg) | ノベノ政主 | (一般用) | (2−5歳) | (一般用) | (2−5歳) | | | |
| イソロイシン | 93 | 350 | 250 | 180 | 140 | 194 | | | |
| ロイシン | 169 | 635 | 440 | 410 | 144 | 155 | | | |
| リジン | 146 | 549 | 340 | 360 | 161 | 153 | | | |
| メチオニン・シスチン計 | チオニン・シスチン計 63 | | 220 | 160 | 107 | 147 | | | |
| フェニルアラニン・チロシン計 | ェニルアラニン・チロシン計 177 | | 380 | 390 | 174 | 170 | | | |
| スレオニン | 80 | 298 | 250 | 210 | 119 | 142 | | | |
| トリプトファン | 25 | 93 | 60 | 70 | 154 | 132 | | | |
| バリン | 122 | 457 | 310 | 220 | 147 | 208 | | | |
| ヒスチジン | 53 | 200 | - | 120 | - | 167 | | | |
| 全窒素量(g) | 0.3 | | | | | | | | |

