

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	189	209	130	127
ロイシン	1.0%	326	384	233	202
リジン	0.9%	320	192	120	216
メチオニン	0.3%	92	192	113	
シスチン	0.1%	49			
メチオニン・シスチン計	0.4%	140	366	222	147
フェニルアラニン	0.5%	179	262	154	
チロシン	0.4%	148			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	327	419	253	250
スレオニン	0.5%	172	244	147	164
トリプトファン	0.1%	50	80	48	55
バリン	0.6%	220	279	168	133
ヒスチジン	0.4%	149	108	65	62
アルギニン	0.6%	206	192	120	175

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	189	311	250	180	124	173
ロイシン	326	537	440	410	122	131
リジン	320	527	340	360	155	146
メチオニン・シスチン計	140	231	220	160	105	145
フェニルアラニン・チロシン計	327	539	380	390	142	138
スレオニン	172	283	250	210	113	135
トリプトファン	50	83	60	70	139	119
バリン	220	363	310	220	117	165
ヒスチジン	149	245	-	120	-	204
全窒素量(g)	0.6					

