

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	192	209	133	129
ロイシン	0.9%	328	384	237	206
リジン	0.9%	324	192	122	220
メチオニン	0.3%	94	192	115	
シスチン	0.1%	48			
メチオニン・シスチン計	0.4%	141	366	227	150
フェニルアラニン	0.5%	178	262	157	
チロシン	0.4%	150			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	329	419	258	255
スレオニン	0.5%	172	244	150	167
トリプトファン	0.1%	50	80	49	56
バリン	0.6%	220	279	171	136
ヒスチジン	0.4%	155	108	66	63
アルギニン	0.6%	205	192	122	178

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（％）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	192	307	250	180	123	171
ロイシン	328	526	440	410	120	128
リジン	324	519	340	360	153	144
メチオニン・シスチン計	141	226	220	160	103	141
フェニルアラニン・チロシン計	329	527	380	390	139	135
スレオニン	172	276	250	210	110	131
トリプトファン	50	81	60	70	134	115
バリン	220	352	310	220	114	160
ヒスチジン	155	249	-	120	-	208
全窒素量(g)	0.6					

