

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	214	209	147	143
ロイシン	1.0%	371	384	263	228
リジン	0.9%	360	192	135	243
メチオニン	0.3%	105	192	127	
シスチン	0.1%	52			
メチオニン・シスチン計	0.4%	156	366	251	166
フェニルアラニン	0.5%	203	262	174	
チロシン	0.4%	173			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	376	419	286	282
スレオニン	0.5%	190	244	166	185
トリプトファン	0.1%	56	80	54	62
バリン	0.7%	251	279	189	151
ヒスチジン	0.4%	168	108	73	70
アルギニン	0.6%	225	192	135	197

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	214	314	250	180	126	175
ロイシン	371	545	440	410	124	133
リジン	360	529	340	360	156	147
メチオニン・シスチン計	156	229	220	160	104	143
フェニルアラニン・チロシン計	376	552	380	390	145	142
スレオニン	190	280	250	210	112	133
トリプトファン	56	83	60	70	138	118
バリン	251	369	310	220	119	168
ヒスチジン	168	246	-	120	-	205
全窒素量(g)	0.7					

