

サプリメント

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	235	209	156	152
ロイシン	1.0%	408	384	280	243
リジン	1.0%	404	192	144	259
メチオニン	0.3%	125	192	136	
シスチン	0.2%	63			
メチオニン・シスチン計	0.5%	188	366	267	177
フェニルアラニン	0.6%	231	262	185	
チロシン	0.5%	192			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	423	419	304	300
スレオニン	0.5%	223	244	177	197
トリプトファン	0.2%	65	80	58	66
バリン	0.7%	290	279	201	160
ヒスチジン	0.5%	192	108	78	74
アルギニン	0.6%	254	192	144	210

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	235	288	250	180	115	160
ロイシン	408	498	440	410	113	121
リジン	404	494	340	360	145	137
メチオニン・シスチン計	188	230	220	160	105	144
フェニルアラニン・チロシン計	423	517	380	390	136	133
スレオニン	223	272	250	210	109	129
トリプトファン	65	79	60	70	132	113
バリン	290	355	310	220	114	161
ヒスチジン	192	235	-	120	-	196
全窒素量(g)	0.8					

