

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	214	209	172	167
ロイシン	0.8%	367	384	308	267
リジン	0.8%	357	192	158	285
メチオニン	0.2%	107	192	149	
シスチン	0.1%	54			
メチオニン・シスチン計	0.4%	160	366	294	195
フェニルアラニン	0.4%	202	262	204	
チロシン	0.4%	165			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	367	419	335	330
スレオニン	0.4%	197	244	195	217
トリプトファン	0.1%	56	80	63	72
バリン	0.5%	248	279	222	177
ヒスチジン	0.4%	171	108	86	81
アルギニン	0.5%	233	192	158	231

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	214	320	250	180	128	178
ロイシン	367	549	440	410	125	134
リジン	357	534	340	360	157	148
メチオニン・シスチン計	160	239	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	367	549	380	390	145	141
スレオニン	197	294	250	210	118	140
トリプトファン	56	84	60	70	140	120
バリン	248	371	310	220	120	168
ヒスチジン	171	256	-	120	-	213
全窒素量(g)	0.7					

