

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	246	209	167	163
ロイシン	1.0%	432	384	299	259
リジン	0.9%	396	192	154	277
メチオニン	0.3%	149	192	145	
シスチン	0.2%	70			
メチオニン・シスチン計	0.5%	220	366	286	189
フェニルアラニン	0.5%	239	262	198	
チロシン	0.5%	200			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	439	419	325	321
スレオニン	0.5%	240	244	189	211
トリプトファン	0.2%	69	80	62	70
バリン	0.7%	311	279	215	171
ヒスチジン	0.4%	197	108	83	79
アルギニン	0.7%	314	192	154	224

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	246	295	250	180	118	164
ロイシン	432	517	440	410	118	126
リジン	396	474	340	360	139	132
メチオニン・シスチン計	220	263	220	160	120	164
フェニルアラニン・チロシン計	439	526	380	390	138	135
スレオニン	240	287	250	210	115	137
トリプトファン	69	83	60	70	138	118
バリン	311	372	310	220	120	169
ヒスチジン	197	235	-	120	-	196
全窒素量(g)	0.8					

