



アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	197	209	148
ロイシン	0.9%	339	384	265
リジン	0.9%	339	192	136
メチオニン	0.3%	101	192	128
シスチン	0.1%	48		
メチオニン・シスチン計	0.4%	148	366	253
フェニルアラニン	0.5%	182	262	175
チロシン	0.4%	149		
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	331	419	288
スレオニン	0.5%	185	244	167
トリプトファン	0.1%	52	80	54
バリン	0.6%	231	279	191
ヒスチジン	0.4%	164	108	74
アルギニン	0.6%	217	192	136

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	197	315	250	180
ロイシン	339	540	440	410	123	132
リジン	339	540	340	360	159	150
メチオニン・シスチン計	148	236	220	160	107	148
フェニルアラニン・チロシン計	331	528	380	390	139	135
スレオニン	185	295	250	210	118	141
トリプトファン	52	82	60	70	137	117
バリン	231	369	310	220	119	168
ヒスチジン	164	261	-	120	-	217
全窒素量(g)	0.6					

