

ver.4 このレシピのエネルギー		117	kcal	体重の0.75乗	1.74	kg	計算では	0.74	日分となります					
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.1	kg	実際は	1.0	日分とする				
		10/28(sun)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2			
							NRC		AAFCO		NRC		AAFCO	
追加食品		h/d Hills prescription diet 詳細	10.1	総重量				g		老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より	疾患別推奨レベル	体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース
果実類		りんご-生	20	水分				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
いも類		じゃがいも-水煮	8	乾燥重量				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
追加食品		鹿肉五膳 ライト	1.1	エネルギー				kcal		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
				エネルギー密度				kcal/g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
肉類		成鶏・ささ身-生	7.5	たんぱく質				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
豆類		糸引き納豆	2.8	内、動物性蛋白質				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
いも類		さつまいも-蒸し	8	脂 質				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
野菜類		キャベツ-生	5	可溶性炭水化物				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
				繊維 不溶性				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
				維 総 量				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
				灰分				g		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
				ナトリウム				mg		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
野菜類		にんじん・根、皮むき-ゆで	15	カリウム				mg		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
野菜類		なす-ゆで	5	カルシウム				mg		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
				マグネシウム				mg		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
きのこ類		えのきたけ-ゆで	8	リン				mg		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
きのこ類		乾しいたけ-ゆで(柄を除く)	1	カルシウム：リン比				1.26 : 1		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
藻類		刻み昆布	1							乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース
										乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		乾燥重量ベース

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	217	209	150	146
ロイシン	0.9%	373	384	268	232
リジン	0.9%	368	192	138	248
メチオニン	0.3%	107	192	130	
シスチン	0.1%	54			
メチオニン・シスチン計	0.4%	160	366	256	169
フェニルアラニン	0.5%	202	262	177	
チロシン	0.4%	170			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	373	419	291	287
スレオニン	0.5%	197	244	169	189
トリプトファン	0.1%	58	80	55	63
バリン	0.6%	253	279	193	154
ヒスチジン	0.4%	174	108	75	71
アルギニン	0.6%	236	192	138	201

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	217	313	250	180	125	174
ロイシン	373	538	440	410	122	131
リジン	368	532	340	360	156	148
メチオニン・シスチン計	160	231	220	160	105	144
フェニルアラニン・チロシン計	373	538	380	390	142	138
スレオニン	197	284	250	210	114	135
トリプトファン	58	83	60	70	139	119
バリン	253	366	310	220	118	166
ヒスチジン	174	251	-	120	-	209
全窒素量(g)	0.7					

