

アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.0%	6	209	60	58
ロイシン	0.1%	12	384	107	93
リジン	0.1%	13	192	55	100
メチオニン	0.0%	3	192	52	
シスチン	0.0%	2			
メチオニン・シスチン計	0.0%	5	366	103	68
フェニルアラニン	0.0%	7	262	71	
チロシン	0.0%	5			
フェニルアラニン・チロシン計	0.1%	12	419	117	115
スレオニン	0.1%	9	244	68	76
トリプトファン	0.0%	2	80	22	25
バリン	0.1%	10	279	77	62
ヒスチジン	0.0%	4	108	30	28
アルギニン	0.1%	11	192	55	81

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	6	478	250	180
ロイシン	12	967	440	410	220	236
リジン	13	1010	340	360	297	281
メチオニン・シスチン計	5	420	220	160	191	262
フェニルアラニン・チロシン計	12	990	380	390	260	254
スレオニン	9	685	250	210	274	326
トリプトファン	2	187	60	70	312	267
バリン	10	782	310	220	252	356
ヒスチジン	4	347	-	120	-	289
全窒素量(g)	0.0					

