



アミノ酸(参考)					
	このレシピで摂取できる量		このレシピでの推奨量		
	/DM	mg	NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.2%	70	209	149	145
ロイシン	0.3%	124	384	266	231
リジン	0.3%	116	192	137	247
メチオニン	0.1%	33	192	129	
シスチン	0.0%	19			
メチオニン・シスチン計	0.1%	51	366	254	168
フェニルアラニン	0.2%	71	262	176	
チロシン	0.1%	58			
フェニルアラニン・チロシン計	0.3%	129	419	290	286
スレオニン	0.2%	66	244	168	188
トリプトファン	0.1%	21	80	55	63
バリン	0.2%	96	279	192	153
ヒスチジン	0.1%	41	108	74	70
アルギニン	0.2%	74	192	137	200

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	70	308	250	180
ロイシン	124	545	440	410	124	133
リジン	116	508	340	360	149	141
メチオニン・シスチン計	51	224	220	160	102	140
フェニルアラニン・チロシン計	129	566	380	390	149	145
スレオニン	66	291	250	210	116	138
トリプトファン	21	92	60	70	154	132
バリン	96	419	310	220	135	191
ヒスチジン	41	179	-	120	-	149
全窒素量(g)	0.2					

