

サプリメント

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.4%	152	209	136	132
ロイシン	0.7%	262	384	243	211
リジン	0.8%	288	192	125	226
メチオニン	0.3%	90	192	118	
シスチン	0.1%	33			
メチオニン・シスチン計	0.3%	122	366	233	154
フェニルアラニン	0.4%	141	262	161	
チロシン	0.3%	115			
フェニルアラニン・チロシン計	0.7%	256	419	265	261
スレオニン	0.4%	152	244	154	172
トリプトファン	0.1%	39	80	50	57
バリン	0.5%	182	279	175	140
ヒスチジン	0.4%	151	108	68	64
アルギニン	0.5%	178	192	125	183

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	152	307	250	180	123	171
ロイシン	262	531	440	410	121	130
リジン	288	584	340	360	172	162
メチオニン・シスチン計	122	248	220	160	113	155
フェニルアラニン・チロシン計	256	520	380	390	137	133
スレオニン	152	309	250	210	124	147
トリプトファン	39	79	60	70	131	113
バリン	182	368	310	220	119	167
ヒスチジン	151	306	-	120	-	255
全窒素量(g)	0.5					

