

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	212	209	149	145
ロイシン	0.9%	362	384	267	232
リジン	1.0%	385	192	137	247
メチオニン	0.3%	115	192	129	
シスチン	0.1%	48			
メチオニン・シスチン計	0.4%	161	366	255	169
フェニルアラニン	0.5%	185	262	177	
チロシン	0.4%	159			
フェニルアラニン・チロシン計	0.9%	344	419	290	286
スレオニン	0.5%	196	244	169	188
トリプトファン	0.1%	53	80	55	63
バリン	0.6%	238	279	192	153
ヒスチジン	0.5%	197	108	75	71
アルギニン	0.6%	255	192	137	200

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	212	327	250	180	131	181
ロイシン	362	558	440	410	127	136
リジン	385	594	340	360	175	165
メチオニン・シスチン計	161	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	344	531	380	390	140	136
スレオニン	196	303	250	210	121	144
トリプトファン	53	82	60	70	137	117
バリン	238	368	310	220	119	167
ヒスチジン	197	305	-	120	-	254
全窒素量(g)	0.6					

