

サプリメント

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.5%	220	209	178	173
ロイシン	0.8%	371	384	319	277
リジン	0.8%	364	192	164	295
メチオニン	0.3%	126	192	155	
シスチン	0.2%	77			
メチオニン・シスチン計	0.4%	203	366	305	202
フェニルアラニン	0.5%	217	262	211	
チロシン	0.4%	175			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	392	419	347	342
スレオニン	0.4%	209	244	202	225
トリプトファン	0.1%	63	80	66	75
バリン	0.6%	274	279	230	183
ヒスチジン	0.4%	165	108	89	84
アルギニン	0.6%	269	192	164	239

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	220	296	250	180	118	164
ロイシン	371	499	440	410	113	122
リジン	364	490	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	203	273	220	160	124	171
フェニルアラニン・チロシン計	392	526	380	390	139	135
スレオニン	209	280	250	210	112	133
トリプトファン	63	84	60	70	140	120
バリン	274	369	310	220	119	168
ヒスチジン	165	222	-	120	-	185
全窒素量(g)	0.7					

