

アミノ酸(参考)				
	このレシビで摂取できる量		このレシビでの推奨量	
	/DM	mg	NRC	
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.7%	290	209	166
ロイシン	1.1%	497	384	298
リジン	1.1%	470	192	153
メチオニン	0.4%	161	192	144
シスチン	0.2%	86		
メチオニン・シスチン計	0.6%	247	366	285
フェニルアラニン	0.6%	281	262	197
チロシン	0.6%	241		
フェニルアラニン・チロシン計	1.2%	522	419	324
スレオニン	0.6%	258	244	188
トリプトファン	0.2%	78	80	61
バリン	0.8%	359	279	214
ヒスチジン	0.5%	205	108	83
アルギニン	0.7%	307	192	153

アミノ酸スコア(参考)						
このレシビで摂取できる量 (mg)	窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点パターン		アミノ酸スコアを計算する(%)		
		1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	
		イソロイシン	290	312	250	180
ロイシン	497	535	440	410	122	131
リジン	470	506	340	360	149	140
メチオニン・シスチン計	247	266	220	160	121	166
フェニルアラニン・チロシン計	522	562	380	390	148	144
スレオニン	258	277	250	210	111	132
トリプトファン	78	84	60	70	140	120
バリン	359	386	310	220	125	176
ヒスチジン	205	221	-	120	-	184
全窒素量(g)	0.9					

